

JAK ROZPOZNAĆ PIERWSZE OBJAWY AUTYZMU

od 6 miesiąca życia dziecka.

DZIECKO:

- nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, np. podczas karmienia;
- nie reaguje na uśmiech lub gesty ze strony bliskiej osoby;
- nie zwraca uwagi na wołanie po imieniu
- nie lubi być dotykane, przytulane lub nie reaguje na dotyk;
- nie gaworzy w wieku 12 miesięcy;
- nie naśladuje prostych gestów np. „pa-pa” - machania dłonią;
- nie mówi w wieku 16 miesięcy;
- jest „odległe”, nieobecne, nie bawi się tak, jak inne dzieci

AUTYZM - zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. Jest pojęciem, które obejmuje szerokie **spektrum** zaburzeń.

Im **szybciej** wykryjesz nieprawidłowości w rozwoju, tym większe szanse na wykorzystanie **całego potencjału dziecka!**

SYMPTOMY AUTYZMU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

trudności w budowaniu relacji
z innymi dziećmi




brak/ograniczony kontakt wzrokowy



śmiech lub płacz
nieadekwatny do sytuacji



widoczna izolacja



opór/lęk przed zmianą



działanie według harmonogramu



nadmierne przywiązanie
do przedmiotów



kręcenie przedmiotami



nadmierna lub niska ruchliwość



niezrozumiałe dla otoczenia
zachowania: kręcenie się w kółko,
klaskanie, machanie rękami



nadwrażliwość lub niedowrażliwość
na dźwięk i światło



powtarzanie słów lub zdań (echolalia)



ciągła, dziwna dla otoczenia zabawa



JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI...

Możesz zasięgnąć porady:

- pediatry,
- neurologa,
- psychiatry
- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub w ośrodku terapeutycznym wspierającym osoby ze spektrum autyzmu.

Nie istnieje jedno badanie, na podstawie którego można zdiagnozować lub wykluczyć autyzm.

Zaburzenie, jakim jest autyzm u każdego objawia się **inaczej**, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu.

Diagnoza stawiana jest zwykle przez **zespół specjalistów** (np. psychiatrę, pedagoga, psychologa, logopeda, pediatrę) na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami.